

Pflanzenbau Aktuell Nr. 11/2024 – 17.04.2024

Herbizideinsatz in Kartoffeln

Das Kartoffellegen konnte auf vielen Flächen bereits seit dem Osterwochenende durchgeführt werden, sodass ein Großteil der Bestände bestellt ist. Die Unkrautbekämpfung genießt in der Kartoffel höchste Priorität. Dabei hat sich eine Voraufmaßnahme bis eine Woche vor kvD als Standard etabliert, da diese in Sachen **Wirkungssicherheit** und **Kulturverträglichkeit** die sicherste Maßnahme darstellt. Beste Wirkungsleistungen werden bei einer Herbizidapplikation auf **gut abgesetzte, feuchte Dämme** erreicht. Durch den Einsatz von **0,3-0,4 + 0,75-1,0 l/ha Quickdown + Toil** werden auch bereits aufgelaufene Unkräuter sicher erfasst.

Auf sehr trockenen oder humosen Böden kann eine Nachaufbehandlung aufgrund einer Festlegung der Bodenwirkstoffe nötig sein. Hier besteht jedoch die Möglichkeit von Phytotox.

Empfohlene Produktkombinationen für die Voraufanwendung in Kartoffel

Herbizid-kombinationen	Aufwandmenge (l bzw. kg/ha)	Anwendungs-zeitraum	Wirkung auf											
			Ackerfuchschwanz	Flughäfer	Hühnerhirse	Amarant	Bingelkraut	Franzosenkraut	Gänsefuß, Melde	Kamille	Klettenlabkraut	Schwarzer Nachtschatten	Windenknöterich	Knöterich-Arten
Metribuzin-frei														
Bandur + Proman	2,5 + 2,5	VA	xxx	x(x)	xxx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	xx(x)	xx(x)	x(x)	xx	xx(x)
Boxer + Bandur	2,5 + 2,5	VA	xxx	x(x)	xxx	xxx	xx(x)	xx(x)	xxx	xx(x)	xxx	xx	xx	xx
Boxer + Proman	3,0 + 2,0	VA	x(x)	x(x)	xx	xx	x	xxx	xx(x)	xx	xx(x)	xx(x)	xx	xx
Novitron DamTec + Proman	2,0 + 2,0	VA	x(x)	x(x)	xxx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	xxx	xx(x)	x(x)	xx	xxx
Proman + Centium 36 CS	2,0-2,5 + 0,25	VA	(x)	-	xx(x)	xx(x)	xx	xxx	xxx	xx(x)	xx(x)	xx	xx	xxx
Metribuzin-haltig														
Arcade¹⁾	4,0-5,0	VA & NA ²⁾	xx(x)	x(x)	xx	x(x)	x(x)	xxx	xx(x)	xx(x)	xx(x)	xx	xx	xx
Bandur + Artist³⁾	2,0 + 2,0	VA	xxx	x(x)	xx(x)	xx	xx	xx(x)	xxx	xxx	xx(x)	x(x)	xx	xx
Boxer + Sencor Liquid	4,0 + 0,5	VA	xx	x(x)	xx	x(x)	xx	xxx	xx(x)	xx(x)	xx(x)	xx(x)	xx	xx
Novitron DamTec + Sencor Liquid	2,0 + 0,4	VA	xx(x)	x(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	x(x)	x(x)	xx
Proman + Metric	2,0 + 1,0	VA	xx	-	xxx	xx(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	x(x)	xx	xx(x)

¹⁾ Drainauflage NG405 beachten!

²⁾ Anwendungsempfehlung NA: 2,0 l/ha

³⁾ Hohe Ansprüche an die Bodenfeuchtigkeit

Hinweis: 0,2-0,4 l/ha Herbosol unterstützt die Haftung des Bodenherbizids an den Bodenteilchen. Die Gefahr der Verlagerung in tiefere Bodenschichten auf lockeren Dämmen oder durch starke Niederschläge wird somit verringert.

Die **Bekämpfung von Ungräsern** erfolgt im 3- bis 4-Blatt-Stadium der Gräser (NA Kultur). Es empfehlen sich beispielsweise **1,0 l/ha Fusilade Max** (Quecke 2,0 l/ha), **1,0 l/ha Agil S** (Quecke 1,5 l/ha) oder **0,75 l/ha + 1,0 l/ha Select 240 EC + Radiamix** (Quecke 1,0 + 1,0 l/ha).

Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!

Rupp Landhandel GmbH
Bahnhofstraße 101
55234 Framersheim

Tel.: 06733/92500-0
Fax: 06733/92500-27

info@rupp-landhandel.de
www.rupp-landhandel.de