

Pflanzenbau Aktuell Nr. 7/2024 – 03.04.2024

Herbizideinsatz in Sommergetreide

Die Aussaat von Sommergetreide konnte zum Teil schon umgesetzt werden, oder wird bei Befahrbarkeit der Flächen baldmöglichst stattfinden. Somit ist es an der Zeit sich Gedanken über die anstehende Herbizidbehandlung zu machen.

Die zur Verfügung stehende Produktpalette im Bereich der Gräserbekämpfung in Sommergetreide fällt im Vergleich zum Wintergetreide etwas kleiner aus, ermöglicht aber in der Regel dennoch solide Bekämpfungsleistungen. Besondere Aufmerksamkeit bei den Ungräsern gilt der **Jährigen Rispe** und **Flughafer**, Ackerfuchsschwanz und Windhalm spielen eine eher untergeordnete Rolle, müssen aber bei Befall bekämpft werden.

Für die Bekämpfung zweikeimblättriger Unkräuter steht ein größeres Produktportfolio mit einem breiten Wirkungsspektrum zur Verfügung. Grundsätzlich sollte sich die Produktauswahl nach dem **vorhandenen Unkrautspektrum** richten. Dazu sind **Bonituren im Feld** sowie **Erfahrungswerte** zum Unkrautaufreten auf den einzelnen Flächen unverzichtbar. Dominierende Unkräuter in Sommerkulturen sind **wärmeliebende Arten** wie Windenknöterich, Gänsefuß, Melde, Stiefmütterchen und Kamille.

Um die Produktgruppe der Sulfonylharnstoffe zu entlasten, bietet sich bei wüchsiger Witterung der Einsatz wuchsstoffhaltiger Herbizide an.

Ausgewählte Herbizide zur Anwendung in Sommergetreide ab BBCH 13

Wirkungsschwerpunkt	Produkt/-kombination	Aufwandmenge (l bzw. kg/ha)	zugelassen in
Breite Mischverunkrautung	Ariane C/Agni	1,0	SG, SW, SH, SD ¹⁾
	Biathlon 4D + Dash E.C.	0,07 + 1,0	SG, SW, SH, SD
	Concert SX	0,1	SG, SW, SH
	Croupier OD (ab BBCH 20)	0,6	SG, SW
	Omnera LQM	0,75-1,0	SG, SW
	Pointer Plus	0,05	SG, SW, SH
	Zypar	1,0	SG, SW, SD
Kamille, Klettenlabkraut, Klatschmohn, Kornblume, Knöterich-Arten	Ariane C/Agni Tomigan XL	1,0 0,75-1,0	SG, SW, SH, SD ¹⁾ SG, SW, SH
Unkräuter + Jährige Rispe + Windhalm	Husar Plus + Mero	0,15 + 0,75	SG, SW, SD
Unkräuter + Ackerfuchsschwanz + Flughafer	Axial 50 + Tomigan XL	0,9-1,2 + 0,75-1,0	SG, SW, SD

SG = Sommergerste SW = Sommerweichweizen SH = Sommerhafer SD = Sommerdurum ¹⁾ nur Agni

Gegen hartnäckige **Wurzelunkräuter** wie Acker-Kratzdistel oder Winde in Sommergetreide ist die Anwendung von **1,0-1,5 l/ha Ariane C** (keine Zulassung in Durum) sicher und nachhaltig. Auch zur Bekämpfung von Durchwuchskartoffeln in Sommergetreide bietet Ariane C mit 1,5 l/ha Aufwandmenge eine gute Wirkungsleistung.

Hinweis: Achten Sie bei der Applikation auch auf die Anwendungsbedingungen. **Wüchsige Witterung mit Temperaturen > 15 °C, hohe Luftfeuchtigkeit > 60 %** und Bodenfeuchte (je nach Wirkstoff) fördern die Wirkungsleistung der Herbizide. Zudem gilt es auf die Unkrautgröße und Kulturabdeckung zu achten. In Sommerungen sind diese Anwendungsbedingungen in der Regel günstiger als bei Winterungen und Blattfrüchten.

Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!

Rupp Landhandel GmbH
Bahnhofstraße 101
55234 Framersheim

Tel.: 06733/92500-0
Fax: 06733/92500-27

info@rupp-landhandel.de
www.rupp-landhandel.de